

Prova Prática

Pontuação total: 10

Prazo: 14/10/2024 - A ser marcado em aula

Nome:	Matrícula:
Nome:	Matrícula:

A prova deve ser feita por no máximo dois alunos.

Na resolução da prova use as funções geradoras de dados (`gerar_dados`, `gerar_dados_rl` e `gerar_tdf`), todas disponíveis no arquivo [gerar_dados_v11.R](#) na [página da disciplina](#).

A função `gerar_dados` foi programada para gerar uma amostra aleatória estratificada de pessoas do município X. As variáveis aleatórias de interesse são: Y_1 (medido em un), Y_2 (medido em un) e **Sexo**. Adicionalmente, assuma que Y_1 e Y_2 não podem assumir valores reais negativos.

A função `gerar_tdf` foi programada para gerar uma tabela de distribuição de frequências do tipo comum, dessas que se encontra em publicações. Considere que esta tabela descreve uma análise de seu interesse (já publicada) e que é necessário determinar as medidas estatísticas básicas com finalidades de entendimento e comparações.

A função `gerar_dados_rl` gera uma amostra de um estudo sobre influência de uma variável fixa X (medido em un) sobre uma variável aleatória Y (medido em $un.dia^{-1}$).

Todos os dados gerados são fictícios e tem finalidades exclusivamente didáticas para fins de avaliação prática em análise quantitativa de dados.

Realizar a análise dos dados com respostas às questões propostas.

1 AED: Apresentações tabulares e gráficas (2.0)

Considere os dados gerados pela função `gerar_dados` para a questão.

1.1 Diagrama de caixa (boxplot) para Y_1 e Y_2 (1.0)

- (0.5) Antes e após a eliminação de possíveis outliers¹;
- (0.5) Após a eliminação de possíveis outliers².

1.2 Para Y_1 (1.0)

- (0.5) Uma apresentação tabular contendo apenas as freqüências: absoluta (F_i), relativa (Fr , %) e acumulada (Fac , %), nessa ordem²;
- (0.5) Histograma e o polígono de freqüência acumulada dos dados².

2 AED: Medidas estatísticas básicas (3.0)

2.1 AED: Medidas determinadas a partir dos vetores (1.5)

Considere os dados gerados pela função `gerar_dados` para a questão.

Para as variáveis Y_1 e Y_2 elaborar apresentações tabulares² contendo as seguintes estimativas:

- (0.5) Tendência central: média, mediana e moda;
- (0.5) Posição: quartis e decis;
- (0.5) Dispersão: amplitude total, variância, desvio padrão e coeficiente de variação.

¹Não distinguindo sexo

²Para cada sexo: M seguido de F

2.2 AED: Medidas determinadas a partir de apresentações tabulares (1.5)

Considere os dados gerados pela função `gerar_dados_tdf` para a questão.

Elabore uma apresentação tabular contendo:

1. (0.5) Tendência central: média, mediana e moda;
2. (0.5) Posição: quartis e decis;
3. (0.5) Dispersão: amplitude total, variância, desvio padrão e coeficiente de variação.

3 AED: Medidas estatísticas de associação (1.5)

Considere os dados gerados pela função `gerar_dados` para a questão.

1. (0.5) Estimativas: covariância e correlação linear simples²;
2. (0.5) Diagramas de dispersão dos dados^{2,3};
3. (0.5) Um estudo semelhante foi realizado em um outro município, por outras pessoas. Contudo, as unidades de medida usadas foram: Y1 ($100 * un$) e Y2 ($100 * un$).

Para comparar associações entre as variáveis de ambos os estudos, qual seria a medida estatística recomendada? Justifique.

4 AED: Regressão linear (2.5)

Considere os dados gerados pela função `gerar_dados_rl` para a questão.

1. (1.0) Ajuste aos dados dois modelos de regressão linear: polinômios de grau I e II (ambos não forçado para a origem) e apresente as análises dos modelos;
2. (1.0) Apresente diagramas de dispersão dos dados⁴ com os modelos ajustados.
3. (0.5) Com base nos gráficos e na análise da regressão, qual modelo melhor explica o fenômeno em estudo? Justifique com fundamentação estatística.

5 Contextualização (1.0)

Localize um artigo científico (periódico Qualis A ou B) em área de seu interesse no qual a análise exploratória de dados (AED - possivelmente com medidas de associação e uso de regressão linear como modelo explicativo) teve papel preponderante. Discuta o artigo com ênfase nos recursos da AED usados e também na adequação das normas básicas das apresentações gráficas e tabulares adotada pelo periódico.

6 Bônus (1.0)

Pelos critérios de ajustamento e escolha de modelos vistos em aula, os coeficientes de determinação (r^2) de modelos lineares ajustados (forçados e não forçados para a origem) são comparáveis? Justifique com fundamentação estatística.

Observações:

- Para possibilitar a correção, anexe esta prova devidamente preenchida na primeira página das respostas.
- As normas para apresentações gráficas e tabulares são obrigatórias, serão observadas e corrigidas.
- Sugere-se (mas não é obrigatório) o uso do ambiente R na resolução das questões propostas.
- Cada hora de atraso na entrega da avaliação implica na perda de 25%. Portanto, após 4 horas não entregue.

³Considere Y2 no eixo das ordenadas e Y1 no eixo das abscissas

⁴Considere Y no eixo das ordenadas e X no eixo das abscissas